

DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCAE,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICO CHIRURGICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS, *manè discutienda in Scholis Medicorum, die Martis vigesima tertia mensis Februarii. An. Domini M. DCC. LXVIII.*

M. AUGUSTINO ROUX, Regiæ Societatis rei Agrariæ, necnon Regiæ Scientiarum Academiæ Burdigalensis Socio & utriusque Pharmaciæ Professore, Doctore Medico, Præside.

An in Cachecticis quibusdam liceat, in aliis minimè magnas operationes Chirurgicas peragere.

I.



AUCI sunt morbi ex naturâ suâ incurabiles, pauciores lethales, paucissimi tandem quibus non noverit ars Medica mederi. Ecce tamen eâ quâ valer in Gallicis tractibus peritiâ & aliarum nationum artificibus præstat Chirurgus, minoris modò, modò majoris momenti operationem instituit, mox se novum morbum priori tantum addidisse advertit ex accidentibus nequè prævisis neque faciliè supponendis, quandò ab operatione non pendet. Nunc verò in alio subjecto operationem tardiùs peragere suadent rationes plurimæ: Præparatoria auxilia adhibet Medicus, hoc vel illud sanguinis, lymphæ, aliuvse humoris vitium emendare intendit, dum urget ex aliâ parte operationis necessitas. Quid agendum? sapè curæ huic medicamentorum suppellectili dum studes, in pejus ruit æger ex parte morbi operationem requireris. Si verò vix sopitâ humorum diatheli peragatur operatio, metuendum est ne idem recrudescat morbus cui mederi priùs intenderas, & novas vires acquirat eundo. Viribus tandem exhausta organa quam recipiunt materiam pessimâ metastasi à parte affectâ accedentem diuriùs foveat, dum ipsamet pars parùm levatur quia exhauriri non valet: hinc sensim serpit malum, universalius fit & vergit ad exitum qui sapiùs arti tribuitur quam nefandæ fortunæ. Nunc bilis, nunc pituita, majori quam par est, quantitate gignuntur aut cruor abundat nimis? quandoque melancholicus & ipsemet arrabiliaris aut vitreus humor sobolescent; tot denique vitiorum generibus inficitur lymphæ quot sunt formæ modi. Nec sat est primarios illos, secundariosve humores quantitate, qualitate, motu, pravisque illorum vitiorum innumeris effectibus peccare, & illa omnia à non naturalium rerum abusu accersita, tandem præternaturalia facta, instante operatione, Chirurgi manum retinere: His sapiùs adduntur dolose subrepentes magni momenti morborum reliquæ à scorbuto, lue venereâ, aliisque causis pendente vitia, eaque proteiformia, vel ipsimet morbi à longo tempore existentes, nullis tamen aut dubiis criteriis sese prodentes qui majoris aut minoris operationis datâ occasione suis effectibus patefcerent. Tam diversa est natura ut apertè indicantia, elanculum verò contrâ-indicantia simul ferat! Porro nostrum est considerare an ubi signa aut signis deficientibus, metus & suspiciones alicujus ex illis vitis habentur, simulque requiritur operatio Chirurgica ad curandum diverse speciei morbum, liceat illam tentare. Invenimus alia esse vitia quæ Chirurgi manum retinere valent, in prædictis angustis, alia verò esse quæ cuiusque voles, operationi numquàm renovent. Nec pures nos leviores humorum alterationes seu discrasias opponere permagni momenti vitis. In medium è contrâ ferre juvabit illas quæ curationes requirunt longiores, difficiliores, quarum specifica nondum satis constant apud Practicos, illasque eis opponemus quæ specifica nota habent hodierno usû confirmata. Illis invitis poterunt institui magnæ operationes Chirurgicæ, dum his existentibus vulnusculum cacoëtes aut lethale fit ulcus, echymosis in apostema mutatur, multaquæ à leviori causâ mala accidunt concomitante pejori aliâ ægri dif-

positione. Sat sit exempli loco, præter cacochymiam variolosam, arthriticam, &c., scrophulas indicasse quæ nec artus fracti reductionem, nec Lithotomiam, nec Christallinæ lentis extractionem aliasque ejusdem momenti Chirurgicas operationes institui non inibent; dùm in Scorbuto, lûe venerâ, alisque in thesibus decursu notandis, vix licet, illis non prius curatis, etiâ parvam quam vocant Chirurgiam instituere, sive à prædictis morbis originem duxerit ille qui operationem requirit sive à causis aliis extrinsecus advenientibus. Ecce primo intuitu patet nostrum argumentum, sed in quibusdam cacochymicis aut virû aliquo infectis licere, in aliis minimè, magnas operationes Chirurgicas peragere.

I I.

PRAVUS ille corporis habitus in quo non solum fluida sed etiam solida corporis humani corrumpuntur cachexia vocatur. In illâ continentur cacochymia sed alicujus humoris naturalis & vitiosi simul redundantia & virû variae species quæ ratione præsertim contagii (quod tamen in multis speciebus valdè incertum est) ab illâ differre dicuntur. Primus Hippocrates vel libri (a) cuiusdam ipsi ascripti autor (Polybus vulgò recensetur) quatuor humores (b), bilem nempe, melancholicam, pituitam, cruorem, in vasis corporis humani contineri affirmavit (c), eosque plus minùs aliis abundantes aut à debita proportione recedentes, morbis originem dare recensuit. Illorum quicumque à naturali statu deflectens aut aliorum miscelâ coinquinatus numerosiores similes & compositos magis constituebat humores. Hinc flavâ bile, pituitâ aut serosis humoribus nimis refertum corpus ad atram bilem, pituitam vitream, aliaque cacochymiae species vergere dicebatur aut ipsis laborare. Accessit Praxagoras qui decem diversos humores in sanguine contineri affirmavit. Sed si ulterius progrediamur, minus deinceps constat, ad usque Galeni ævum, quis locus, quive honor illis humoribus tributus sit ab Antiquis Methodici enim vix ad illos attendebant. Pneumatici atherico suo humori phenomena morbosa magis ascribere. De illis apud Empiricos majores facta tuit mentio, sed sine systemate, ullo practico in his fundato. Vix enim hac in parte, primo illorum omnium auctori atponendi sunt, quamvis contragentia humores & purgantia varia tel gerint pro humorum diversitate. Calculum his omnibus addidit Galenus, eo quo valuit animo in Praxagoram insiliens, diu inquisivit si quibus ille tantam humorum diversitatem collegerat, aut illa dâ se traxit à inquisivisse declarans illius commenta irrita (d), Prædictos à Polybo excogitatos humores recensuit iterum & morbosus phenomenis applicuit. Illa verò omnia cum suis significatione intacta hoc-utque mansere, invitis nunc Chymicorum nunc etiam quorundam Dogmaticorum opinionibus. Quin imò sensim adausus est eorum catalogus, aliunde Galeni principis lucitus, variorum auctorum laboribus & sæpe commentis ditatus. Porro primariis illis humoribus, quando facti sunt morbofi, id est copîa, aut qualitate, aut motû peccantes ascripta sunt vitia quæ sunt tenacitas, densitas, crassities, tenuitas, expansio, putredo, austeritas, glutinositas, acrimonia, excessus aut defectus (e) & alia quæcumque potuit invenire analysi magis ratiocinio quam observationibus innixa. Hinc non solum universali massæ vel cuidam primariorum humorum generi prædictas dotes ascriperunt, sed privatis moleculis vitia tribuerunt quæ referuntur ad magnitudinem, figuram, pondus, coherentiam inter se, consistentiam (f). Aliundè eadem spectata vitia vitia in morbofis humoribus proprium nomen habentibus quales sunt pus, ichor, catharrofa diathesis, rheumatica, cancrofa, arthritica, scrophulosa, gangrenosa, venerea, scorbutica, &c. (g). In Chirurgicis operationibus ad illos humores respectum habuere Medici, ideoque præparantia varia invenere quibus deleterentur morbofe diatheses antequam novos morbos artis operarent. Cum enim ex suppurationis dotibus in plerisque Chirurgicis catibus, pendear operationum successus, has dotes minimè obtinere didicerunt nisi sanum esset antea corpus, id est, humoribus illis, quantum par est, orbatam. Hic enim bilis intendit organum lase partis, fluidiorem sanguinem impetû rûere sinit aut cogit, suppurationis ergò labori obstitit. Illic pituita facili fluxilibus illam partem humoribus alluit, quibus dives sanguis in ichorem continuò immutatur. Melancholicus humor tenax, facili spiscescens motum partis remittit, vel quandoque intenso solidorum robore ruit in dirum pathema, partemque subito ita afficit ut pessimæ dotis suppuratio exinde oriatur, nuncque vigeat nunc remittatur. Deficientis cruoris esse-

(a) Lib. 4. de morbis.

(b) De quibus tamen in aliis locis loquitur ipsemet, Hipp.

(c) Conf. Gal. de natur. facult. l. 1. c. 9.

(d) Galen. de digu. pult. l. 4. c. 2.

(e) Gortez. Chirurg. repurg. l. 1. c. 4. p. 20. Astruc Tradam

(f) Pathol. Boerrh. Institut.

(g) Conf. eod. ibid.

(g) Gortez. lib. cit. p. 7-20.

nam aut in artubus aut in aliâ corporis parte scorbuticam videbîs sine oris fœtitudine usâ, gingivarum lividâ tumefactione, demum scorbuti oris signo ullo. Ad quam tunc classẽ reduces morbum? Signa demitte & causas indaga. Ille victus pravam indolem, parcimoniam, ingesta salita, acria, scorbutica labis causam efficientem esse affirmabit (p). alius causam conjunctam & simul aëris temperiem frigidam & humidam pro efficiente habebit (q). Tamen sine prægressu tali aëris constitutione, maculas videbis scorbuticas, livido, atro colore, sensus defectu gangrenam amulantes, easque cum Leptothymiis, dispneâ quotidie augeſcentibus plûs minds festinanter ad mortem ducere ægros scorbutum oris nullum habentes. Equis aliud te docuit sanguinis inspectio, etiã in cadaveribus? Nunc sanguinis dissolutionem, nunc spissitudinem (r). Hæc quidem communia cum aliis morbis habebit scorbutus, hæc etiã diversa habebit variis suis temporibus (s). Sed in angustia rei extans ad morbum confirmatum accedo invitus. Quantumvis ille tunc diversis se signis prodât & oppositis causis gignatur, de ejus existentia satis plerumque consentiunt Medici. At non ita explicita, quando magis urget necessitas, apparent morborum signa. Ecce filulam ani indomabilem, operatione semel institutâ. Quæ crescit quotidie carnes, quæ apparet suppuratio, mali sunt moris; accedit febricula mitis sed cetius depalescens ægrum. Præhæbis illis quæ viscerum abdominalium infarctus, si qui sine, referandi vim obtinere & deinde amarorum, adstringentium, corticis Peruviani præparationibus omnibus, præmissis demum variis causticis, tandem ad rationalia signa recurrere cogimur, namque morbus cui jam peractâ operatione mederi intendebamus, nullum ex se latens significat virus. Prodeunt metus & suspicio, viginti ab hinc annis discimus ægrum illum gonorrhœi venereâ fuisse tentatum, & quantum ex ipsius narratione colligi potest, rectè curatum. Quantum tamen in dubiis licet, si verè licet, accipiem experimat mercurium, in pejus tuit æger quâ scorbuto laborat, tandemque à lædendis ad juvantia docimur, sed tarde nimis ad specifica morbi remedia nos devenisse perpescimus. Quanta tûm debeat esse Medici prudentiæ juncta doctrina, & ex experimentis sapius inanibus, aliquando turis facta experientia, neminem quâ ambigere. Ex prægressis enim causis dubia plurima, ex signis quæ tunc consulerè datur, adhuc majora oriuntur. Nec certius nosces morbi genus ex artuum nocturnis doloribus, ultimum vulgè refugium, quando quidem in scorbuto, lue venereâ, rheumatismo æquè inveniuntur & passim pro signis variorum morborum pathognomonicis habentur (r). Quid! quotidiana febris Rythmum per annos servavisse vidimus artuum dolores qui noctû evanescebant (& adhuc videmus) in malè curatâ prius lue venereâ. Similes verò an malias in arthritide, athmate, aliusque chronicis morbis quis non vidit? Quid ergo in mædiâ Chirurgici morbi operatione in quâ sapius tantum premunt temporis angustia, tentabis anceps naturæ morbi latentis? Operationem si peragas, mox instante ægri letho, virûs quandam speciem accusabis, sicut in acuris febrim malignam, quando malè succedit curatio, non delinis accusare. Utriusque non inficias ibo exempla dari, quamvis affirmaverit magni nominis auctor (v) febrim malignam esse raram in terris avem, & audaces videamus alios, nullo habito respectu ad ægri dispositionem, magnas operationes sine morâ peragere. Frequentius tamen causas illas in medium proferre, ne accusetur industria, malum; illas omnino negligere, ut extollatur industria, pejus. Quantum ergo ille agant in corpus, quæ fiant magnas præci operationes Chirurgicas, quæ verò operationum successui possint officere, ulterius consideremus.

I I I.

PESSIME in cacochymicis corporibus quæ naturalium humorum redundantia laborant magnas imò & parvas operationes Chirurgicas quandoque successisse probant experimenta. Sit fit exempli loco proutisse leves scarificationes quæ in hydrocele, anasarca, ædemate peraguntur, quæque gangrenam quandoque accerunt (a). Ità in ascite paracenthesim quandoque præcedit gangrena, & operationem aliundè utilem infamat. Sed si alius generis exemplum requiras, Ictericum diuturnum considera. ani filulâ tentatum, vasorum abdominalium infarctu, mesenterii, hepa is, aliorumque viscerum obstructionibus refertum. Ille sanè ex institutâ operatione

(p) Eugalen. lib. cit. cap. 1. pag. 3.

(q) Lind. loc. cit. pag. 144.

(r) Traité des Maladies des gens de mer, par M. Poissonier, p. 65 & suiv.

(s) Id. ibid.

(t) Conf. David, Abercrombii Tota & eff. curande lue ven-

neræ method. Astruc, de morb. vener. Lind. Traité du Scorbut, & alii qui de hoc signo disceptaverunt.

(u) Passim fautoribus non carens Sidenh. Conf. ejus oper. omni. p. 270. & alibi passim.

a) Sidenh. Oper. omni. p. 346. ubi agit etiã de vesicacæ tum periculosâ applicatione.

in pejus ruet. Non minùs tamen constat cachochymii illis vulgò artem mederi quandò in extremo non versantur acri, & ex humero casuum in quibus bene succedere sive prædictæ sive aliæ operationes concludendum sanè est illas rariùs contraindicari à cachochymia biliosa, melancholica, pituitosa variis speciebus. Idem dicendum de cachochymii quibusdam quæ proprio nomine donantur, quandò in aliis de quibus priùs loquemur, non eadem remanet spes. Itaque caries, exostoses, car nomata venerea omnibus remediis superiora sunt, difficiliss curantur, nec remediis aliis cedunt priusquam usù mercurii in meliorem naturam mutata fuerint (b). Majora his si fuerint vel minorà symptomata, etiàm non usi specifico curabuntur. Sed observatum est aliundè media in Chirurgici morbi, amputationis nempe ob scloperi ictum, peractæ curâ, residendum fuisse quousque verus venereus virus nullo se prodens alio quam morbi diuturnitate criterio, demùm ablatum fuerit (c). A virù scorbutico callos ossium priùs fractorum deleri visum est, iterumque recrudescere fracturas quousque curato scorbutico spontè de novo agglutinantur ossa (d). Imò in nondùm confirmato scorbutico, sed solum incipiente callos in ossibus nequam formari posse mirabili exemplo confirmat Meadius (e). Periostium à ferè omnibus corporis ossibus separatum invenit Petrus in cadaveribus scorbuticorum (f). Epiphyfes ab ossium corporibus separatas, osseam costarum partem carie tentatam & in putrilaginem redactam fuisse refert Pouparius (g). A Partibus mollibus ossa, ipsorumque substantiam spongiosam citius pervadit morbus ille quandò ablata est eorum lamina externa (h). Musculi gangrenâ affecti & sanguine nigro-putrido pleni reperti sunt (i). Vulnera post quinquaginta annorum spatium recrudescere inceperunt (k). Demùm si hujus morbi observationes, naturam, symptomata, solidorum & fluidorum indolem consideremus, constabit sanè in subiectis scorbuticis periculosas imò lethales esse magnas operationes Chirurgicas. Nec mirum cum etiàm minores periculosæ sint: namque observatum est contusiones & leviora vulnera in diuturniora ulcera degenerare (l), vesicatoria gangrenam inducere (m), solam fasciarum ope partium deligationem etiàm gangrenam producere (n), illamque fungos in fundo ulcerum nycthemeri spatio gangrenosos reddere. (o). In gangrenâ humidâ nullum est gangrenosum virus ante validas in mollibus partibus contusiones, ante valorem compressiones in artubus luxatis, fractis, antè subitanèam inflammationem à causis tum externis, tum internis productam, tuncque scarificationes, amputationes, aliaque auxilia morbo debellando idonea idèò utilia sunt quia partes vicinas liberant à compressione quam inducebat pars affecta. Sanguis equidem putrescens, resolubilis, alkaline indolis ad illud tandem tenuitatis punctum accedere potest ut vasa libera permeet, & viris officio fungatur, sed citiùs hominem interimit. Namque à tempore cessationis dolorum ad usque proximum agoneum delirare incipit homo, facies subitò immutatur, frigescunt artus, pulsus languidior est, crebrior, myurus aut intercurrent, status omnium functionum tranquillior lubricus evadit. Præstantia ergò remedia, auxiliaque è Chirurgiâ petenda retardare malum quandò virus non absorptum à partibus vicinis aut fortè vix formatum est. Illo enim existente in massa sanguineâ, prædicta symptomata citiùs accedunt & inutilis est operatio. At verò in gangrenâ siccâ quæ exiit apud exhaustos, senes, pravo victu nutritos, &c. è longinquo paratur virus, sensim fascit sanguis, resolvitur, putridus evadit, larens demùm sub cineribus ignis erumpit & à partibus debilioribus aut à centro motù diffusis tandem ad ipsumque centrum vadit. Quandoque accedente motu inajore fit veluti crisis virù illius in parte jam affectâ ubi limites figit malum, organorum pravam materiam repellentium vices agunt cor & arteriæ, augetur vis omnium vitalis, accedit uppuratio propè mortuam partem in circulo à natâ instituto (p). tuncque licet artus amputationem adhibere (q). Si verò limites non adhuc posuit gangrena, suppuratio n n inchoata est, demùm prædicta salutis non apparere signa cum aliis quæ vulgò solent bonum corporis statum indicare, metus est ne peragendam amputationem excipiat mors;

(b) Astruc, de morb. vener. tom. 1. lib. 2. c. 11. p. 224.

(c) Bagl u. Examen de quelq. Points de la Chirurg. t. 2.

(d) Lind. Traité du Scorbut, tom. 2. p. 349.

(e) Apud Lindium, tom. 1. pag. 460.

(f) Traité des malad. des os, nouv. édit. t. 2. pag. 443. suiv.

(g) Acad. Roy. des Sc. Mem. pag. 238. ann. 1699.

(h) Lind. t. 2. p. 331-460.

(i) Id. ibid. p. 434.

(k) Id. ibid. pag. 449.

(l) Id. ibid. t. 1. p. 204.

(m) Murres apud Lindium, t. 1. p. 211. not. E. & ipsi Lind. pag. 364.

(n) Lind. lib. cit. t. 1. p. 367.

(o) Id. ibid.

(p) M. Boucher, suite de la Lettre du mois de Nov. MDC. 34. France p. 155.

(q) Id. ibid.

Solum modò in amputatione carnes paulò flaccidiore erant quam vulgò accidit, pùs paulò tenuius, sed remissiore erant febris & inflammatio. Quod quidem prestare puto: habemus enim in promptu remedia quibus intendamus tonum partis affectæ, ideoque majorem inflammationem, si opus fuerit, urgamus, cum è contrà inflammatio vividior spontanea sæpius periculum afferat in calibus adeò lubricis. Quoad catharticæ operationem, sæpius frequenter in scrophulosis tentari necessum est, qui oculorum morbis (*) obnoxii sunt. Optimè successit illa quam peragi vidi ut & lithotomia in alio scrophuloso. Ultimæ huic nostræ observationi favet experimentum D. *Hoin* Chirurgici Divionensis. Ille anno 1759 calculum è velicâ eduxit puero sex annos nato. Urgebant operationem dolores viviiores, contra-indicabatur illa, sic loquente Chirurgo, tumoribus scrophulosis in utroque colli latere acervatis. Sed metus erat ne ante scrophulatum curationem periret æger, proindè Lithotomia peracta fuit 12^a ejusdem mensis die. Priùs ille æger quam alii eadem die secti, curatus fuit, imò nec per totum morbi decursum, febre la-ravit (y). Arthritica diathesis (& à fortiori Rheumatica) aequè finit ac scrophulosa magnas peragi operationes Chirurgicas. Illa enim quondò inveteravit calculum producit qui Lithotomiæ æquè curatur in senibus ac in aliis. Sed in illis etiàm partibus in quibus sedem ponit nullum offert periculum quondò de operatione Chirurgicâ agitur. Accepimus enim in arthritico 62 annos nato quâ 25^e annis ter aut quater quolibet anno per duos menses, arthritide laborabat, fenolice & sæpius brevi tempore occalluisse ossa cruris fracta cum diallasi quamvis ante casum ab arthritidis paroxismo vix liberatus esset æger imò & fracturæ curatio paroxisimum revocaverit. Alia cacochymiarum genera propriis nominibus donata, qualia sunt pùs & ichor, cum sint effectus aliorum morborum quorum natura priùs respicienda est, prætermittimus. Ità etiàm cacochymiam variolosam, herpeticam, scabiosam, lacteam, &c. cum minoris sint momenti, quoad finem quæ intendimus, quam illæ de quibus priùs diximus, etiàm prætermittere juvat. Illas enim non respicimus tanquam in extermum degeneratis quo in casu comparandæ etiàm essent cacochymix biliosa, melancholica, pituitosa variis speciebus quæ tandem quandoque morbos ab obitu letales ex se producunt. Atque apud nos de calibus sane lubricis sed non ità malis ut citissimam mortem producant. Nec erit diendi locus de Elephantiasi cum ille morbus parùm notus ex toto ferè orbe nunc exulaverit. Satis sit cognitis magnarum operationum periculis, juxta cachexiarum naturam, ejusdem diversitatis causas indagare.

IV.

PATEBIT sanè ratio discriminis priùs indicati si attendatur humores omnes morbosos; quondò peccant quantitate, motu, & qualitate in ordinibus ad crasim & consistentiam diversa necessàrio edere producta aut effectus varios. Quondò enim humores naturales spontè facti sunt morbosi seu principia illorum in vitia degeneraverunt, variè exiungunt intemperies, si cum antiquis nominibus conveire placeat, quales sunt pituitosa, melancholica, biliosa quæ ad sanguinis massam referuntur. Idem orientur cacochymix variæ, scrophulosa nempe, arthritica si lymphæ seu succus nutritius admodum quantitate, motu aut qualitate peccet. Sed illi humores à naturali statu spontè seu propriè vi defleat & abusu sex rerum non naturalium. Si à prioribus oriatur causis depravatio humoris nutritii, in quibusdam solùm accidit circumstantiis quales sunt ætatem variæ mutationes, quondò morbi quidam malè curati sunt, imperfecta fuit crisis, variolæ in scrophulosis defuerunt, aut quondò se illis ætas subactionem materiæ omnis nutritiæ perficere non valeus, illam materiam in articulos majores, quam par est, quantitate ferri finit & arthritidi locum dat. Si ab abusu sex rerum non naturalium prædicta oriatur humoris nutritii depravatio, tunc diversis accidit temporibus, definitis periodis minùs adscribitur quam in primo casu. Consideratâ nunc differentiâ variarum cacochymiarum facillè deduces eas esse eo magis periculosas quo humorum depravatio magis recedit à statu in quem humores facillè, levi de causâ, aut ex se abeunt. Hincque facillè patet venereum virus scrophuloso periculosius habendum & absolutè & quondò peragendæ sunt operationes Chirurgicæ. Sed adhuc majus est periculum depravationis spontanæ humorum, quondò illi ad dissolutionem potius vergunt quam ad spissitudinem, hincque patet discrimen periculi inter varias etiàm à statu naturali minùs recedentes cacochymiarum species. Æquè conveniunt cum homine, servatâ tamen morbi magnitudinis ratione, intemperies scrophulosa, arthritica, herpetica, &c. ac biliosa & pituitosa.

(*) Charmetton, lib. cit. pag. 44-45.

(y) Mercure de Décembre, année, 1759-p. 110a.

Etenim in Ichrophulis adest singularis vergentia ad lentos & tenaces humores, & succorum præsertim glandulorum tenacitas accidere videtur ab acido prædominante. Quod cum acidum à naturali statu minùs recedat, inertius sit ob remissum humorum motum in illo morbo, lymphæque ita irretitum ut non nisi sensim & sine sensu extricari possit, aliis humorum actionibus non officit quæ requiruntur ut benè succedat operatio Chirurgica. Idem affirmabis de cacochymia arthrica, rheumatica, variolosa, lactea, herpetica quæcumque aliæ pro causâ nullum habent exuberans acidum & à solâ humorum tenacitate cum redundantia pendent, aliæ vero scrophulosam diathesim emulantur aut virus ipsi affine habent, quæ causa est cur in illam sæpius delinquant. In labe venerea è contrâ, acidum priùs heterogeneum, motibus quos ipsummet excitat, periculosum factum, malas semper corpori injurias fert. Eadem accidunt in cancro virû quod fluida omnia in consensum trahit & eò citiorem dissolutionem inducit quo plus remediis vel spontè excitatur. Scorbutica tandem & gangrenosa labe diversas à prædictis causas agnoscunt, alkalino-oleosis principiis, quas assequuntur partes, ne dicam totum corpus, inducunt ad putrilaginem quæ cum sit omnibus Chirurgicis operationibus insensa, non minus prædictas labe earum successui officere & pericula augere.

V.

INDUSTRIÆ humanæ limites vix posuisse videtur benevola natura, eique præsertim Medicinæ parti quæ docet corporis nostri affectibus manû mederi. In illâ tamen parte, ut & in aliis, multa sunt præjudicia quæ nisi paulatim excutiantur, vix sperandum de ulterioribus ipsius progressibus. Tale illud est præceptum: *Nullam tentandam esse operationem quamdiù existit quoddam in corpore virus.* Huc, ni fallor, nudentes adegit malè instituta analogia cui centies repetitæ præstat unicuique experimentum, etiâ periculosum. Nec sufficit in hac parte errores autoritate fulcitos per sæcula viguisse & dogmatum loco habitos fuisse ut nostra convellatur thesis. Illa enim autoritas nil aliud nobis imperat quam severius scrutinium morborum in quibus ex institutis operationibus, pejora mala accidere aut nulla, propter causas aliorum morborum in corpore latentes. Difficilior quidem est illa inquisitio cum dogma prædictum melioris notæ observationibus ad illud spectantibus viam præciderit. Hinc tamen ne concludas nos potiora probationum genera non attigisse, cum, silente analogiâ, nostris inquisitionibus facem attulerint experimenta. Unde licet tandem sic concludere:

Ergo in cachecticis quibusdam licet, in aliis minimè, magnas operationes Chirurgicas peragere.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Ambrosius HOSTY.

M. Anna-Claudius DOAIGNY.

M. Bartholomæus - Tussanus
LE CLERC, Consiliarius Medicus
Regis ordinarius in ejus
Castello.

M. Joannes MAC-MAHON,
Antiquus Exercituum Regis &
Nosocomiorum Militarium
Medicus, Regia Scholæ Militaris
Medicus ordinarius.

M. Ludovicus-Joannes-Baptista
COSNIER.

M. Ludovicus-Gabriel DUPRÉ,
Serenissimi Principis Condæ
Consiliarius Medicus.

M. Franciscus THIERRY, Regis è
Salubri Consilio, Regii Medicorum
Collegii Nancei, Socius
Honorarius Regiæque ejusdem
civitatis Scientiarum & humaniorum
Litterarum Academia.

M. Hugo CAPET.

M. Antonius PETIT, è Regiâ
Scientiarum Academia.

Proponebat Parisiis BERTRANDUS DUPUY, Arreenfis in Valle Aurensi, Diocesis Convenarum, in Universitate Tolosana Doctor Medicus, & Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus. Theos Auctor. A. R. S. H. 1768. à sextâ ad meridiem.